HÉTÉROCÈRES NOUVEAUX DE L'AMÉRIQUE DU SUD

par Paul Dognin.

ARCTIADÆ.

Ischnocampa tovia n. sp. — 42 mill. — Dessus des supérieures brun jaunâtre pâle, coupé par une ombre noirâtre partant de la base, traversant l'aile en son milieu, puis remontant à l'apex, avec un point noir au milieu de la cellule, deux plus petits points noirs se faisant vis-à-vis, l'un au coin supérieur de la cellule, l'autre au départ et entre 6 et 10, un trait en dessous de la médiane, formant points à ses deux extrémités, enfin une série intranervurale de traits subterminaux, plus allongés entre 6, 7 et 8. Inférieures plus pâles, les nervures et la région apicale plus sombres. Dessous des supérieures brunâtre, le bord terminal et une série de taches subterminales (fondues dans le fond), plus pâles. Franges pâles. Tête, thorax et pattes brun jaunâtre, dessus de l'abdomen brun noirâtre, touffe anale jaune pâle.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou; deux ♂.

Cette espèce est excessivement voisine de *mamona* Dgn.

NOTODONTIDÆ.

Pseudodryas luteopunctata n. sp. — 46 mill. — Antennes très longues, pectinées jusqu'au delà du milieu; palpes relevés, les deux premiers articles très poilus et dépassant la tête, le troisième article très petit; les supérieures à apex obtus et bord terminal droit jusqu'à la 4, puis s'arrondissant vers l'angle interne; 5 en dessus du milieu de la discocellulaire; 6 de l'aréole à l'angle de la cellule; l'aréole très étroite; 7, 8, 10 de l'extrémité de l'aréole. Aux inférieures 3 et 4 d'un point, 6 et 7 courtement tigées; 8 quittant la 7 avant le milieu de la cellule. Dessus des premières ailes d'un brun marron, rougeâtre dans les régions costale et apicale, avec des reflets lilacés plus pâles dans la région interne entre les seconde, troisième et après la quatrième lignes. Quatre fines lignes transversales pâles, droites ou à peine infléchies, à peu près parallèles, savoir : la basilaire en deux tronçons non suivis, l'extrabasilaire et la médiane n'atteignant pas le côte, enfin la subterminale; entre la première et la quatrième lignes les traces d'autres petites lignes également parallèles; quatre petites taches jaunes sous-costales, deux avant la seconde ligne séparées par la sous-costale, les deux autres à l'extrémité supérieure de la cellule, enfin une série subterminale de chevrons noirs éclairés en partie de lilacé et

placés entre les nervures. Frange concolore. Dessus des secondes ailes blanc, les nervures et un liséré terminal brunâtres, la frange blanche et brune. Dessous des premières ailes d'un brun noirâtre uniforme, la côte pâle; des secondes ailes blanc. Vertex brun avec un fin liséré blanc; devant du thorax brun très sombre; ptérygodes saupoudrées de poils blancs; dessus du corps, dernier anneau et touffe anale bruns; reste de l'abdomen blanc jaunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; deux ♂.

Dicentria ravana n. sp. — ♂ 38 mill. — Dessus des supérieures avec le centre brun noir, les bords costal, terminal et interne largement fauve pâle. Le brun central avec le bord extérieur creusé entre 4 et 6 et émettant avant l'apex une pointe sur la côte qui est coupée de clair à cet endroit; une série terminale de chevrons bruns intranervuraux, le chevron entre 2 et 3 remplacé par un gros point; quelques atomes noirs vers le milieu du bord interne, un fin liséré terminal brun; la frange jaunâtre coupée de poils bruns. Dessus des supérieures blanc sale, les nervures et le bord terminal grisâtres. Dessous blanc sale. Tête, milieu du thorax et pattes fauve pâle; ptérygodes et dessus du corps brunâtres.

♀ 46 mill. — Pareille au ♂, mais le centre brun moins bien délimité, envahi de fauve, les bordures claires du ♂ en partie rembrunies, le gros point entre 2 et 3 bien marqué comme dans le ♂. Inférieures et dessous des ailes grisâtres.

San Salvador; une paire.

Dicentria? Hertha n. sp. — 40 mill. — Dessus des supérieures d'un fauve noisette marbré de blanchâtre dans la moitié supérieure, les nervures en partie brunes; la cellule contenant une tache orbiculaire indécise suivie d'un trait noir, puis de la réniforme également peu nette; une ligne transversale arrondie, à peine indiquée au premier quart de l'aile, enfin quelques ombres subterminales brunes entre les nervures. Inférieures blanches, la côte et le bord terminal largement enfumés; la frange blanche. Dessous des premières ailes gris, la côte coupée de blanchâtre, le bord terminal largement marbré de blanchâtre; la frange grise, plus sombre à l'extrémité des nervures. Dessous des inférieures comme le dessus. Vertex avec une touffe de poils bruns; front et dessus du corps fauve noisette.

Tucuman; une ♀.

Meragisa dasra n. sp. — 46 mill. — Dessus des supérieures blanc argenté, saupoudré en partie de fins atomes noirs. Les dessins, noirs, se composent de lignes très incomplètement dessinées, savoir : une basilaire, une extrabasilaire indiquée au départ

de la côte qu'elle ne coupe pas par un gros point, puis par un petit trait sur la 1, une médiane encore moins bien marquée coupant un point cellulaire, une extracellulaire indiquée par un double trait juste en dessous de la côte, quelques traces intérieures et un chevron entre 2 et 3. Cette ligne est immédiatement suivie d'un double chevron entre 4 et 6, puis, un peu plus loin, d'un autre entre 6 et 8. Enfin, au bord terminal, un fin liséré en lacets formant dents intérieures intranervurales et dents extérieures sur l'extrémité des nervures; la côte coupée de trois points noirs après l'extracellulaire. Dessus des inférieures noirâtre uniforme, le bord abdominal largement recouvert de longs poils jaunâtres. Dessous des quatre ailes noirâtre uni, la base des ailes et le bord abdominal des inférieures jaunâtres. Franges blanches dessus et dessous. Tête et thorax blanc mêlé de quelques poils noirs; dessus de l'abdomen noirâtre, chaque anneau finement bordé de jaunâtre; ventre jaunâtre; extrémité anale blanche.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un ♂.

Meragisa darida n. sp. — 48 et 50 mill. — Dessus des supérieures blanc argenté, saupoudré de fins atomes bruns, les dessins noirs. Ceux-ci se composent d'une fine ligne basilaire, d'une extrabasilaire géminée, doublement plus écartée de la base au bord interne qu'à la côte, d'un trait cellulaire, d'une extracellulaire également géminée, quittant la côte peu avant l'apex, coudée intérieurement entre 2 et 3, 4 et 6 et aboutissant au bord interne peu avant l'angle, enfin d'un liséré terminal chevronné entre les nervures; la côte coupée deux fois au-dessus du trait cellulaire. Dessus des inférieures noirâtre uni, le bord abdominal largement couvert de longs poils jaunâtres. Frange blanche. Dessous des quatre ailes noirâtre, l'apex, le bord terminal des ailes et le bord abdominal des inférieures largement blanchâtres. Tête, thorax, dessus des derniers anneaux et touffe anale blanc mêlé de poils bruns, dessus du reste de l'abdomen noirâtre; ventre jaunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; deux ♂.

Se place tout auprès de *pallida* et *politioides* Schs.

Lobeza Schausi n. sp. — ♂ 62, ♀ 78 mill. — Dessus des supérieures blanc saupoudré d'atomes noirs et jaunes, traversé par deux lignes noires. La première, extrabasilaire, sinueuse, doublement plus écartée de la base au bord interne où elle finit sur un crochet qu'à la côte qu'elle quitte sur un trait oblique; la seconde, extracellulaire, composée de chevrons intranervuraux bordés extérieurement de blanc, puis d'une ombre noire, presque droite, sauf au départ de la côte et entre 3 et 4. Bord terminal festonné de demi-lunules encadrant un point terminal entre chaque nervure; frange

blanche sauf sur ces points. La ♀ indique, en outre, un petit point noir à l'extrémité inférieure de la cellule. Dessus des inférieures d'un brunâtre uni avec l'indication d'une ligne médiane pâle partant de l'angle anal; la frange blanche. Dessous blanc grisâtre, se fonçant sur les nervures et notamment sur la côte des premières ailes. Tête et thorax couverts de longs poils gris; corps brunâtre.

Merida, Venezuela; deux ♂, une ♀.

Cette espèce se place entre *aglone* Herr. Sch. et *favilla* Dgn. et se trouve aussi dans la collection de M. Schaus.

Hemiceras constellata n. sp. — ♂ 46, ♀ 50 mill. — Bord interne des supérieures bien sinueux; dessus des premières ailes d'un brun sombre lilacé et luisant, semé de quelques atomes et avec les dessins blanc d'étain. Ceux-ci se composent : d'une ligne extrabasilaire de points nervuraux assez droite enfermant un gros point basilaire à cheval sur la 1 ; de deux points à l'extrémité de la cellule, le supérieur plus petit; d'une double ligne extracellulaire également marquée de points nervuraux, quittant le bord interne non loin de la première ligne au milieu du sinus, se coudant extérieurement sur la 2 pour aboutir droit à la côte peu avant l'apex, enfin d'une ligne subterminale de points également à cheval sur les nervures. Frange concolore semée de poils blancs. Dessus des inférieures d'un brunâtre uni, les veines plus sombres, la frange blanchâtre. Dessous des premières ailes brunâtre uni, le bord interne pâle ainsi que le dessous des secondes ailes. Tête et thorax brun sombre lilacé; un point blanc au départ de chaque antenne, des poils blancs formant taches sur les ptérygodes et le milieu du thorax; dessus de l'abdomen brunâtre, le dessous pâle.

Costa-Rica (P. Biolley); plusieurs ♂ et une ♀.

Hemiceras pogoda n. sp. — 58 mill. — Dessus des supérieures mousse rosé pâle, traversé par trois lignes rougeâtres; les deux premières sinuées et parallèles coupent l'aile peu après la base et l'espace entre elles deux se fonce sensiblement; elles sont suivies d'un très gros point ovale, rougeâtre et à contours vineux, dont le centre repose sur la discocellulaire ; la troisième ligne est oblique, quitte le bord interne au troisième quart, court droit sur la 7 où elle se coude pour aboutir à la côte peu avant l'apex; la région terminale s'éclaircit par une sorte de reflet différent sans que pourtant la teinte du fond semble changer et contient, imperceptibles, des points subterminaux noirs entre les nervures. La côte est vineuse; la frange mousse rosé. Dessus des inférieures grisâtre, la frange jaune. Dessous des premières ailes grisâtre, le bord terminal rosé, la côte, l'extrémité des nervures et la frange jaunâtre rosé; dessous

des secondes ailes et frange paille pâle. Front brun, collier brun liséré de jaune rosé; dessus du corps grisâtre, l'anus et le dessous du corps jaunes; pattes jaunes, l'extrémité brune.

Mérida, Venezuela; une ♀.

Cette espèce ne se rapproche d'aucune de celles que je connais.

GEOMETRIDÆ.

Miantonota nigrisquama n. sp. — 24 mill. — Les quatre ailes vert tendre traversées par deux lignes communes, blanches, non tremblées : une extrabasilaire légèrement coudée extérieurement, une extracellulaire, droite aux supérieures du bord interne à la 6 puis se coudant intérieurement vers la côte, s'incurvant aux inférieures de la 3 au bord abdominal; chaque aile avec un point cellulaire doublement plus gros aux supérieures qu'aux inférieures; la côte des premières ailes lisérée de blanc; les quatre ailes sans liséré terminal avec la frange jaune paille pâle. Dessous blanc verdâtre, les supérieures avec le liséré blanc à la côte, le point cellulaire et la trace de l'extracellulaire, les points et lignes ne reparaissant plus aux inférieures; franges comme en dessus. Vertex blanc, une large tache noire sur les premiers anneaux de l'abdomen, tête et reste du dessus du corps verts; dessous blanchâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un ♂.

Polypœtes fuliginosa n. sp. — 26 mill. — Plus poilu qu'il n'est ordinaire dans ce genre. Les quatre ailes un peu transparentes, gris noir, les nervures marquées de jaune aux premières ailes, les taches, blanches, comme suit : aux supérieures, une basilaire entre la 1 et la médiane de la longueur de la cellule, deux taches immédiatement après la cellule entre 4 et 6; les inférieures avec trois taches placées de la même façon, et, en outre, la cellule en partie blanche et un commencement de tache entre 2 et 3. Frange couleur du fond. Dessous des ailes comme le dessus, mais sans jaune sur les nervures des supérieures et le blanc beaucoup plus envahissant, surtout aux inférieures à peu près blanches sur les deux tiers. Palpes noirs, le premier article jaune; ptérygodes et thorax noirs avec quelques poils jaunes; tête et dessus du corps noirs; ventre avec quelques poils jaunes notamment à l'extrémité anale.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; un ♂.

Tithraustes aliena n. sp. — 22 et 24 mill. — Port de *Polypœtes semilugens* Warr. Dessus des supérieures noir avec quelques nervures légèrement marquées de jaune, une très large tache blanche centrale, assise sur le bord interne, finissant en pointe arrondie sur la sous-costale, le départ de la base restant noir et une

petite tache subapicale ronde, d'un beau jaune. Dessus des inférieures blanc, sauf une large bordure terminale noire et une petite ombre abdominale noirâtre. Franges noires. Dessous pareil. Dessous du corps, des pattes, des palpes et front blancs; dessus des cuisses, des palpes et vertex noirs; ptérygodes noires avec un pinceau de poils jaunes au départ; dessus du corps noir avec quelques poils blancs.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; deux ♂.

Cette espèce mimique le genre *Polypœtes*, mais appartient au genre *Tithraustes* par sa nervulation.

Psaliodes laticlara n. sp. — 24 mill. — Dessus des supérieures blond brunâtre avec la base intérieurement jaunâtre, une large bande transversale également jaunâtre, droite, s'arrêtant à la sous-costale et suivie d'une fine ligne blanche, puis, au troisième quart de l'aile, d'une seconde ligne transversale blanche, composée de chevrons intranervuraux et n'atteignant pas la côte. Entre les lignes, le fond de l'aile se fonce en brun ainsi que sur 5 et 6. La côte zébrée d'écailles blondes. Frange blonde coupée de noir. Dessus des inférieures noirâtre, la frange blonde coupée de noir. Dessous des quatre ailes brunâtre envahi de blond ferrugineux notamment sur les nervures surtout aux inférieures et sous la côte des supérieures, la côte finement coupée d'écailles blondes, les franges blond ferrugineux coupées de noir aux nervures. Tête blonde; thorax brun avec quatre points latéraux jaunâtres; dessus de l'abdomen brun, les anneaux finement lisérés de blond.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; une ♀.

Heterusia picata n. sp. — 28 mill. — Dessus des quatre ailes noir; les supérieures avec une large tache blanche oblongue, assise sur le milieu du bord interne et se terminant sous la sous-médiane et la 3, à bord intérieur droit et bord extérieur émettant de petites saillies et deux toutes petites éclaircies subterminales sur 4 et 5. Les inférieures avec une bande centrale blanche continuant la tache des premières ailes, mais encore plus large, festonnée sur son bord extérieur et laissant le bord abdominal noir. Dessous pareil, mais le bord abdominal des inférieures envahi par la tache et la base des quatre ailes saupoudrée d'écailles blanches. Franges noires. Dessous des palpes et du corps blanc; dessus des palpes, tête et thorax noir saupoudré de poils blancs; dessus de l'abdomen noir.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; un ♂.

Cette espèce n'est très voisine d'aucune de celles que je connais.

Astyochia subliturata n. sp. — 35 mill. — Ailes un peu transparentes; dessus d'un gris blond pâle absolument sans dessin, mais laissant voir par transparence les points et ombres terminales

du dessous. Frange concolore. Dessous avec les discocellulaires marquées de taches noires en forme de trait aux supérieures et d'un gros point noir aux inférieures, ces dernières ainsi que le bord terminal et l'apex des supérieures fortement saupoudrés d'écailles brunâtres; la frange brunâtre au départ, l'extrémité pâle. Tête et corps gris blond pâle.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un ♂.

Cette espèce mimique les *Nipterias* du groupe de *Munda* Warr.

Iridopsis commixtata n. sp. — 30 mill. — Dessus des ailes d'un gris carné clair, un peu sablé de brun et teinté par place de brun jaunâtre pâle avec la subterminale claire, dentée, peu distincte, accompagnée partiellement d'ombres noirâtres. Supérieures avec une tache cellulaire ovale, noire, la coudée l'effleurant en dessous, continuant sur la 5 pour ensuite remonter et atteindre la côte à angle droit, l'extrabasilaire peu arrondie, très rapprochée de la coudée au bord interne. Inférieures claires à la base avec les deux mêmes lignes noires et une plus petite tache cellulaire ovale en forme d'anneau noir, la coudée formant une sorte de grand accent circonflexe, la pointe en dehors sur l'emplacement de la 5, l'extrabasilaire simple et droite. Les quatre ailes festonnées d'un très fin liséré noir, ponctué entre les nervures; la frange couleur du fond. Dessous d'un ochracé très clair, un peu irisé, les supérieures avec une tache cellulaire et une ombre subapicale noirâtres, l'apex restant couleur du fond; cette ombre part de la 4 et est précédée intérieurement de trois points sur 5, 6 et 7. Frange ochracée, noirâtre aux supérieures vers l'ombre subapicale. Pattes postérieures toutes claires, les autres annelées de noirâtre.

Tucuman; un ♂.

Les dessins de cette espèce rappellent en dessus ceux de *bolinaria* Gn. et en dessous ceux de *syrniaria* Gn.

Stenalcidia invenusta n. sp. — 26 à 30 mill. — Dessus des ailes d'un gris carné clair, semé de quelques atomes bruns et teinté par place de brun jaunâtre pâle, la subterminale claire, dentée, traversant un espace à peine plus teinté, avec, en outre, deux lignes communes, sinuées et continues, l'extrabasilaire simple, brune, la coudée géminée, composée d'une première ligne brune plus nette et d'une seconde plus large, en partie fondue dans le fond, tantôt jaunâtre, tantôt brunâtre. Supérieures avec une troisième ligne bien indiquée à la côte seulement, puis se perdant sur la discocellulaire à peu près à distance égale des deux autres lignes, la côte striée de jaunâtre et de brun. Inférieures avec un trait discocellulaire rapproché de la coudée mais ne la touchant pas. Les quatre ailes régulièrement festonnées avec un très fin liséré noir, les

creux des festons intranervuraux et légèrement ponctués; la frange blanche avec quelques poils bruns ou jaunâtres. Dessous d'un ochracé très clair, les supérieures avec une tache cellulaire et une ombre terminale noirâtre coupée d'ochracé entre 1c et 2, 3 et 4 et à l'apex à partir de la 7. Pattes postérieures toutes claires, les autres semées de brunâtre.

Tucuman; plusieurs ♂.

COSSIDÆ.

Eugivira flavescens n. sp. — 32 à 34 mill. — Dessus des supérieures d'un jaune terreux pâle avec quelques reflets rosés, traversé par une série de lignes de points formés d'atomes noirs agglomérés, l'extrémité de la cellule plus particulièrement envahie (dans l'un des exemplaires, ces atomes non seulement se coagulent en points mais envahissent toute une partie de l'aile, rembrunie par ce fait même). Plusieurs de ces lignes sont continues et plus épaisses, notamment les troisième, cinquième et septième, mais d'ailleurs semblent très variables. Dessus des inférieures ochracé clair avec un point cellulaire assez vaguement indiqué et quelques stries notamment vers l'angle anal. Franges couleur du fond avec quelques poils noirs. Dessous semblable, la côte des inférieures coupée par une série de taches. Pattes, thorax et dessus de l'abdomen couverts de longs poils couleur du fond.

San Salvador, Amérique centrale; plusieurs exemplaires.

Eugivira gemina n. sp. — 27 à 31 mill. — Dessus blanc traversé par d'assez nombreuses petites lignes ou stries brunes, bien marquées le long du bord interne, la côte coupée de points noirs et avec deux gros points géminés également noirs vers le milieu interne de l'aile entre 1 et 2. Dessus des inférieures blanc avec quelques petites stries; aux quatre ailes des petits points terminaux doubles, noirs, à l'extrémité de la plupart des nervures; franges blanches coupées de quelques poils brunâtres. Dessous comme le dessus, mais les inférieures enfumées et sans les deux gros points noirs géminés. Pattes et corps couverts de longs poils, blanchâtres sur la tête et le thorax, brunâtres sur l'abdomen.

Mérida, Venezuela; trois ♂.

PYRALIDÆ.

Macalla admotalis n. sp. — 26 mill. — Dessus des supérieures verdâtre semé de blanc pur à la base, le long de la côte et dans la région centrale de l'aile, brun rougeâtre au premier tiers interne et dans toute la région terminale, l'apex compris; un point disco-

cellulaire noir accompagné de blanc, précédé vers la base de deux autres points noirs également accompagnés de blanc, l'un dans la cellule en dessus, le second au-dessous de la médiane; encore deux autres points noirs subbasilaires, l'un sur la côte, l'autre en dessous; deux lignes noires zigzaguées, la première antémédiale du bord interne à la cellule bordant extérieurement la première zone brun rougeâtre, la seconde extracellulaire bordant également, mais alors intérieurement, la zone terminale brun rougeâtre et fortement coudée entre 2 et 3. Dessus des inférieures grisâtre, l'extrémité des nervures et le bord bruns, entièrement irisé de mordoré sous un certain jour. Les franges blanchâtres coupées sur leur milieu de brunâtre. Dessous blanc grisâtre avec les points cellulaires, une large bordure terminale, les supérieures plus sombres et avec une éclaircie subapicale à la côte; les quatre ailes irisées de mordoré sous un certain angle. Extrémité des pattes annelée de clair et de brun.

La Merced, Chanchamayo, Pérou; une ♀.

Macalla albulatalis n. sp. — 27 mill. — Dessus des supérieures roussâtre, tout le centre et la plus grande partie de la base envahis de blanc, avec un petit point cellulaire brun, une ligne antémédiale indistincte et une ligne subterminale sinueuse, fortement dentée et en partie fondue dans le fond. Dessus des inférieures grisâtre luisant, avec une ligne subterminale laissant des points nervuraux peu nets sur 2, 3 et 4 et une ombre terminale. Dessous luisant, d'un ocbracé pâle ombré de grisâtre à la base des supérieures et au bord terminal des quatre ailes, laissant deviner une partie des dessins du dessus. Franges couleur du fond. Pattes antérieures annelées de blanc et de roux, postérieures unies.

Micay, Colombie; une ♀.

Cecidipta abnormalis n. sp. — 37 mill. — Dessus des supérieures d'un mordoré rosé semé de petites écailles brunes, le premier tiers costal jusqu'à la médiane ainsi que l'apex blanchâtres, la côte coupée par une large bande subapicale blanche qui se coude sur la 5 puis se fond dans l'aile, la base entre la 1 et la médiane paille pâle ainsi qu'une large tache assise sur le milieu du bord interne, mais qui n'atteint pas l'angle; quelques petites lignes noires transversales au centre de l'aile, d'ailleurs peu nettes et discontinues, enfin une série terminale de points intranervuraux noirs. Dessus des inférieures d'un blanc pur irisé, avec un fin liséré terminal noir, la frange blanche coupée de quelques poils bruns. Dessous des inférieures brunâtre, la ligne subapicale du dessus reparaissant en clair; dessous des inférieures comme le dessus, mais moins irisé, la côte tachée de brun, sans liséré terminal

ailleurs qu'à l'apex. Franges blanches et rousses aux premières ailes et vers l'apex des secondes ailes, puis blanches.

Yungas de la Paz, Bolivie; 1,000 mètres; une ♀.

Stericta multicolor n. sp. — 23 mill. — Dessus des supérieures jaune verdâtre avec, au premier quart, une tache noire sous la cellule précédée d'une petite touffe de poils blancs et accompagnée d'une ombre ferrugineuse qui descend sur le bord interne; un petit point discocellulaire noir, la région subterminale envahie de ferrugineux et coupée par une série de points nervuraux noirs arrangés en ligne arrondie, les trois premiers partant de la côte sur un petit espace resté jaune verdâtre, le centre de l'aile sablé plus ou moins d'écailles ferrugineuses, le bord terminal liséré de noir sauf aux nervures; la frange teintée de toutes les couleurs du fond, le ferrugineux dominant au départ. Dessus des inférieures d'un blanc légèrement ochracé luisant, un peu enfumé à l'apex et avec un très fin liséré noir rosé; la frange blanche coupée de noirâtre à l'apex et finement noirâtre au départ. Dessous d'un blanc ochracé pâle; la côte, surtout l'apex et le bord terminal aux supérieures, l'apex aux inférieures sablés de ferrugineux; les premières ailes avec l'indication d'une ligne subterminale claire, un petit point noir discocellulaire peu marqué suivi d'une ombre extracellulaire noirâtre, les secondes ailes avec un point discocellulaire noir bien indiqué; lisérés terminaux et franges comme en dessus, ces dernières plus pâles. Tête, thorax et pattes jaune rosé, extrémités des pattes brunes annelées de jaune.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; plusieurs ♂.

Stericta nigrisquama n. sp. — 25 mill. — Dessus des supérieures coupé aux premier et second tiers par deux larges bandes noires, la base et le centre blanc sablé d'atomes jaunes, le bord terminal presque entièrement envahi de jaune et de verdâtre; la première bande interrompue sur la cellule et bordée extérieurement par une ligne pâle, la seconde bande très mince à ses deux extrémités, à centre très élargi et avec un petit sinus blanc à son bord intérieur sur la 4, précédée par un point noir discocellulaire, la partie subapicale de la côte rembrunie, le bord terminal liséré de noir sauf sur les nervures, la frange blanche et grise coupée de noirâtre aux nervures. Dessus des inférieures d'un blanc ochracé luisant, le bord terminal légèrement enfumé surtout vers l'apex et avec une rangée subterminale de traits nervuraux noirâtres; un fin liséré noirâtre coupé sur les nervures, la frange blanc ochracé avec quelques poils noirâtres. Dessous blanc ochracé luisant saupoudré d'écailles jaunes et ferrugineuses avec un point discocellulaire noir à chaque aile et un liséré comme en dessus; les franges blanc

ochracé coupées de noirâtre. Tête, thorax et pattes ochracé rosé, extrémités des pattes noires annelées d'ochracé.

Tucuman ; un ♂.

Parabæra nov. gen. — Palpes allongés, légèrement recourbés, dépassant la tête d'une demi-longueur, peu poilus; antennes pectinées à double et longue ciliation; tibias lisses. Supérieures du ♂ sans touffe de poils sur la côte, mais avec une crête de larges écailles à la base de la cellule en dessus; 4 et 5 tigées partant de l'angle cellulaire parallèlement à 3; 6 du dessous de l'angle supérieur; 7 et 8 tigées de l'angle supérieur ainsi que 9; 11 libre. Inférieures avec 3 de la cellule un peu avant l'angle; 4 et 5 tigées; 6 et 7 de l'angle supérieur, 7 anastomosant avec 8.

Ce genre pourra se placer auprès d'*Abœra* Hmpsn.

Parabæra nitidalis n. sp. — 22 mill. — Supérieures avec la côte peu arrondie, l'apex plutôt obtus et le bord terminal un peu fuyant, mais assez droit; inférieures légèrement coudées sur la 2. Dessus des quatre ailes brun marron uniforme luisant, avec, sous un certain angle, un reflet métallique lilacé dans la région apicale des supérieures et sur le bord terminal des inférieures au-dessus de la 2; un fin liséré arrondi extérieurement, coupant la côte en clair, borde la région métallique aux premières ailes. Dessous gris brunâtre luisant. Corps et franges couleur du fond.

Loja, Équateur; un ♂.

Tosale filata n. sp. — 22 mill. — Dessus des supérieures brun marron, éclairé de gris lilacé, avec deux fines lignes transversales noires, l'une, au premier tiers, assez régulièrement arrondie extérieurement, la seconde, au second tiers, coudée extérieurement à la hauteur de la cellule, rentrant entre 1 et 2 pour ressortir sur le bord interne. Ces lignes sont comme géminées par une petite ombre parallèle extérieure et la seconde est suivie d'une ligne subterminale dentée plus sombre que le fond et à peine distincte. Dessus des inférieures d'un gris légèrement rosé, assombri par une ombre brun noir, subapicale et subcostale finissant sur la cellule et la 3, la 2 fortement ombrée de noir et coupée par un trait subterminal blanc, bordé d'un peu de noir de chaque côté, qui se continue vers l'angle anal. Les franges concolores. Dessous gris rosé, les supérieures avec un trait costal blanc sous l'apex et une ombre intérieure brun noir, les inférieures avec une ligne extracellulaire blanche dentée et une subterminale noirâtre peu marquée; les franges grisâtre rosé. Tête, corps et pattes gris brun rosé.

Loja, Équateur; un ♂.

Se placera auprès d'*aucta* Hmpsn.

Lepidomys Gn. **(Chalinitis** Rag.**) sobria** n. sp. — 16 mill. — Dessus des quatre ailes gris marron; les supérieures avec les traces d'une ligne extracellulaire plus foncée et se fondant dans le fond, une grosse tache costale blanche vers le milieu de la côte et une petite coupure blanche costale servant sans doute de départ à la ligne. Dessous semblable, mais les supérieures sans trace de ligne, la première tache blanche fort diminuée et les inférieures avec une ligne subterminale claire, arrondie. Frange, tête, corps et pattes couleur du fond.

Paraguay; un ♂.

Se placera auprès de *proclea* Druce.

Omphaloptera virginalis n. sp. — 15 mill. — Dessus des ailes d'un blanc brillant, les dessins jaune pâle; supérieures traversées par six lignes, savoir : une basilaire, une extrabasilaire et une antémédiale, les deux dernières recourbées extérieurement et formant un crochet aigu immédiatement avant la côte, une extracellulaire fine et plus sombre, quittant la côte au delà du troisième quart pour descendre jusqu'à la 3 et remonter intérieurement en demi-cercle jusqu'au point discocellulaire noir, puis redescendant au bord interne avec une légère courbure, une subterminale et une terminale plus larges, cette dernière précédée d'un fin liséré noir. Au-dessus du point la côte est suffusée de jaune. Inférieures avec la première ligne en moins, l'extrabasilaire, l'antémédiale et l'extracellulaire droites, parallèles, la subterminale et la terminale comme aux supérieures, arrondies, cette dernière avec le liséré et cinq petits points terminaux noirs entre les nervures de 2 à 7. Franges blanches. Dessous comme le dessus, mais les premières lignes diffuses. Tête et dessus du corps blanc semé d'un peu de jaune.

Loja, Équateur; une ♀.

Omphaloptera completalis n. sp. — 17 mill. — Dessus des ailes blanc, les supérieures avec six lignes comme dans l'espèce précédente, mais élargies et le jaune dilué dans le fond de l'aile l'envahissant presque entièrement. Les trois premières lignes assez droites, parallèles, légèrement arrondies intérieurement, l'extracellulaire franchement noire dans son demi-cercle supérieur, tout l'espace intérieur de ce demi-cercle estompé de noir, la subterminale et la terminale se fonçant également, cette dernière avec le liséré bien marqué. Inférieures avec les trois premières lignes droites, mais la seconde et la troisième se rapprochant un peu et reliées par une ombre brune, les subterminale et terminale arrondies, cette dernière avec le liséré intérieur et les cinq petits points terminaux noirs intranervuraux de 2 à 7 comme dans *virginalis*.

Dessous comme le dessus, mais moins coloré et les trois premières lignes absentes. Franges blanc sale. Tête et dessus du corps blanc et jaune.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; une ♀.

Cette espèce, si voisine de la précédente, semble en différer non seulement par sa coloration, mais aussi par la direction de plusieurs de ses lignes.

Omphaloptera ? stigmatalis n. sp. — 16 mill. — Dessus des ailes d'un blanc brillant, la côte des supérieures jaunie en grande partie, les dessins jaune lavé de brun. Supérieures avec trois larges bandes transversales, la première au premier tiers, à peu près droite, la seconde, plus large encore surtout dans sa partie supérieure, suivant immédiatement un gros point discocellulaire brun et complètement interrompue entre 2 et 3, la dernière, terminale, séparée de la précédente par un tout petit espace, s'arrêtant à la 3 et à centre blanc dans toute sa partie apicale jusqu'au dela de la 5. Inférieures avec une bande subterminale arrondie suivant à peu près l'inflexion du bord et aboutissant à l'angle anal. Franges blanches. Dessous semblable.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; un ♂.

Leucochroma neutralis n. sp. — 23 mill. — Ailes un peu transparentes, le dessus blanc avec les dessins paille pâle, savoir : une bande basilaire et une antémédiale, larges, la seconde s'élargissant encore dans la cellule dont elle envahit tout le centre et se reliant sous la cellule à une large tache discocellulaire carrée, une large bande extracellulaire diffuse, arrondie, suivie d'une bande plus mince parallèle et d'une ligne subterminale coupée de blanc sur les nervures. Un trait transversal noir de la 3, peu après son départ de la cellule, à la 2 caractérise cette espèce qui possède en outre des petits points terminaux sombres à l'extrémité des 4, 6 et 7, sur un très fin liséré terminal. La côte n'est atteinte que par la première ligne, mais le bord interne est jauni par les bandes qui s'y diluent. Inférieures avec un trait discocellulaire noir entouré par une large tache carrée et une double ligne subterminale, la première partant de la côte avant l'apex pour s'arrêter sur la 2, la seconde quittant l'angle anal pour remonter jusqu'à la 7 en dedans de la première; un fin liséré terminal marqué de points sombres à l'extrémité des 2, 6 et 7. Les franges mêlées de blanc et de paille. Dessous brillant, reproduisant en plus pâle et par transparence quelques-uns des dessins du dessus. Tête et dessus du corps blanc suffusé de paille.

Loja, Équateur; un ♂.

Phryganodes hypoxantha n. sp. — 43 mill. — Les quatre ailes d'un gris noirâtre s'irisant légèrement sous un certain angle, avec de larges taches blanches, semi-hyalines, nacrées; la tache des supérieures extracellulaire, oblongue, de la 2 à la 7, précédée de petites éclaircies centrales dans la cellule et sous la médiane; la tache des inférieures envahissant tout le centre de l'aile. Dessous semblable, mais la tache des secondes ailes s'étendant à tout le bord abdominal. Palpes, tête et dessous du corps jaune vif; pattes jaune vif, l'extrémité des dernières paires grisâtre; collier brun, liséré extérieurement de jaune; thorax et dessus du corps gris noirâtre, s'irisant comme le fond des ailes.

Loja, Équateur; une ♀.

Se placera auprès de *Croceiceps* Wlk.

Mimorista longidentalis n. sp. — 27 et 29 mill. — Ailes paille pâle luisant, la côte des supérieures lavée de brun, avec les dessins suivants également brun, irisé de violet et de mordoré sous un certain angle : aux supérieures, un trait au départ de la cellule, immédiatement suivi d'une petite tache carrée; ce trait est le commencement d'une ligne un peu oblique, mais droite, qui atteint le bord interne, remonte aussitôt, toujours en ligne droite et en forme de V sur une seconde tache carrée beaucoup plus grande, située sur la discocellulaire, puis la ligne redescend, toujours en oblique, pour se fondre dans une ombre subterminale d'où part une fine subterminale dentée, précédant une bande terminale plus large à l'apex et entrant dans la subterminale entre 5 et 6. Aux inférieures une tache carrée discocellulaire suivie par une ligne un peu sinueuse qui se dirige vers l'angle anal sans l'atteindre; une subterminale dentée comme aux premières ailes formant un coude extérieur entre 3 et 5, quittant la côte avant la terminale, mais rejoignant celle-ci sur la 2, enfin la bande terminale beaucoup plus large à l'apex, s'amincissant surtout entre 2 et 4. Les taches carrées cellulaires à centre paille. La frange paille et brune. Dessous semblable mais plusieurs des dessins moins nets. Palpes bruns, dessous paille; tête brune, collier paille liséré de brun en avant; thorax et dessus du corps paille, la touffe anale noire.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; trois ♂.

Mimorista pellucidalis n. sp. — 31 à 33 mill. — Ailes semi-hyalines, d'un blanc crémeux luisant, irisé de rose lilacé sous un certain angle, les dessins d'un brun blond, également irisé. Supérieures avec la côte d'un testacé pâle et les dessins suivants : une double ligne basilaire incomplète, une extrabasilaire, oblique dans la cellule, puis formant une grande boucle dont le bas atteint le

bord interne et le crochet extérieur se termine en une ombre en forme d'O remontant sous la médiane; un petit rond cellulaire à centre clair immédiatement après la ligne, puis, sur la discocellulaire, une grande tache carrée à double petit centre blanc d'où sort, en dessous, une ligne à deux branches, l'une descendant sur le bord interne, la seconde obliquant vers l'angle sur une ombre terminale assise sur le bord interne et ne dépassant pas la 2; une très large ombre apicale, pupillée de clair à l'apex, dentée sur son bord intérieur, finissant entre 3 et 4 et précédée par une fine ligne subterminale sinuée, quittant la côte avant l'ombre, reliée aux dents de celle-ci sur 4, 5 et 6 et se perdant dans l'ombre interne vers l'angle. Frange blanche coupée de brun à l'extrémité des nervures. Inférieures avec un point discocellulaire, un commencement de médiane indiquée par deux points entre le bord abdominal et la 2, une ombre apicale ne dépassant pas la 6 mais suivie de petits traits terminaux entre les nervures et une fine subterminale quittant la côte avant l'ombre, se coudant extérieurement juste avant la 5 pour aboutir sur le bord terminal de suite après la 2; frange blanche coupée de brun à l'extrémité des 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dessous comme le dessus, les taches discocellulaires et apicales bien indiquées, les autres dessins reparaissant en partie par transparence. Premières paires de pattes, palpes et tête blanc crémeux taché de brun, le reste des pattes, le corps et la touffe anale du ♂ blanc crémeux.

Loja, Équateur; plusieurs paires.

Cette espèce se placera auprès de *serratilinealis* Led.

Glyphodes intermedialis n. sp. — 22 mill. — Ailes blanches, les bordures brunes, irisées sous un certain jour; supérieures avec la bordure costale large, droite, la bordure terminale également large et un peu concave, mais beaucoup moins que chez *infimalis* Gn. à laquelle, d'ailleurs, cette espèce ressemble de très près. Bordure terminale des inférieures coupée droit, moins large que dans *infimalis*. Frange brune aux supérieures, brune avec la moitié extérieure plus pâle et blanche à l'angle anal aux inférieures. Dessous luisant, les bordures plus pâles. Palpes bruns, le dessous blanc; tête, collier et ptérygodes bruns, quelques poils blancs à la base des antennes; thorax brun, garni de poils blancs à la base comme dans *fuscicaudalis*; dessus de l'abdomen blanc, sauf les deux derniers anneaux qui sont bruns; touffe anale jaunâtre mélangé de brun à son extrémité; pattes et dessous du corps blancs.

Paraguay; un ♂.

Se placera entre *infimalis* Gn. et *fuscicaudalis* Moeschl.

Polygrammodes interpunctalis n. sp. — 28 et 31 mill. — Dessus des supérieures ocre sombre semé d'atomes bruns et traversé

par plusieurs lignes brun noir, savoir : une extrabasilaire coudée extérieurement, une médiane à peine coudée passant sur la discocellulaire, une extracellulaire sinueuse du bord interne à la 5, puis plus large et plus droite, une subterminale sinuée, enfin une ombre terminale laissant un fin liséré terminal couleur du fond; la frange avec la première moitié noirâtre, la moitié extérieure grise. La cellule avec une tache brun noir dans son milieu supérieur, et entre celui-ci et la discocellulaire assombrie par la seconde ligne une petite éclaircie pâle. Dessus des inférieures ocre pâle, le bord terminal sombre, avec les trois lignes suivantes : une médiane droite du bord abdominal à la 2, puis passant sur la discocellulaire, une extracellulaire festonnée entre 2 et 5, une subterminale également festonnée, surtout entre 2 et 5; la frange comme aux supérieures. Dessous des quatre ailes gris légèrement teinté d'ochracé, avec la plupart des lignes et dessins du dessus, mais affaiblis. Tête et dessus du corps ocre brunâtre.

Santo Domingo, Carabaya, Pérou S.-E.; plusieurs spécimens.

Pachyzancla fimbrialis n. sp. — 29 et 31 mill. — Supérieures avec la base costale poilue, une rangée sous-costale de très longs poils retombant dans l'aile et descendant au départ jusqu'au bord interne qui est également poilu. Les quatre ailes d'un gris souris uniforme et luisant, les supérieures avec une vague indication d'un point discocellulaire et d'une subterminale contournée comme dans *semilaniata* Hmpsn, la frange concolore. Dessous des ailes également luisant, gris pâle aux premières ailes, blanc plombé aux inférieures; les supérieures avec le point discocellulaire et la ligne subterminale plus visibles qu'en dessus. Palpes gris, le dessous blanc; tête et dessus du corps gris; dessous, pattes et touffe anale blancs, la première paire tachée de gris.

Loja, Équateur; plusieurs ♂, une ♀.

Rhectosomia? longistrialis n. sp. — 29 mill. — Palpes très allongés, droits, dépassant la tête de plus d'une longueur. Dessus des supérieures blanc coupé dans la première moitié par deux bandes transversales brunes, obliques, rigides et peu distinctes, partant d'avant le milieu du bord interne, la seconde aboutissant à la discocellulaire qui est blanche, en forme de V, le trait blanc du dessus continuant jusqu'à la côte qui est brune et coupée de clair une fois avant et trois fois après. Région terminale brune ou ferrugineuse surtout vers l'apex et coupée de longs et larges traits blancs entre 3 et 5, 6 et 8. Un trait blanc intérieur entre 2 et la discocellulaire. Dessus des inférieures blanc avec des stries terminales sombres; les quatre ailes avec des points terminaux noirs à l'extrémité

des nervures. Franges blanches coupées de brun. Dessous semblable, les supérieures sans l'indication des bandes transversales.

Loja, Équateur; une ♀.

Noorda candidalis n. sp. — 31 à 36 mill. — ♂ avec la côte en dessous simple, sans pli ni touffe de poils; antennes des deux sexes simples sans aucun renflement; palpes labiaux allongés en bec, jaune marron, le dessous blanc. Ailes semi-hyalines, blanches, à reflets nacrés sous un certain angle; les supérieures avec la côte largement teintée de jaune marron uniforme ne se rétrécissant que peu vers l'extrémité apicale; le bord terminal des quatre ailes avec un tout petit point brun à l'extrémité de chaque nervure et un imperceptible liséré. Dessous semblable, la côte des supérieures restant blanche sauf l'extrême bord. Franges blanches. Front et collier blancs, finement lisérés en avant de jaune marron; ptérygodes blanches avec des épaulettes jaune marron réunissant le collier à la base de l'aile; corps blanc, le pinceau anal du ♂ mélangé de poils noirs; pattes blanches, les tibias avec un mince filet jaune et les tarses avec une petite touffe de poils jaunes.

Loja, San Francisco près Loja, Palanda et vallée de la Zamora, Équateur; une série parmi laquelle plusieurs spécimens des deux dernières localités pris en juillet et août 1886.

Pionea illineatalis n. sp. — 21 mill. — Dessus des supérieures couleur noisette, semé de quelques atomes bruns, avec deux gros points noirs, l'un au commencement, l'autre à l'extrémité de la cellule, quatre petits points costaux noirs dans la seconde moitié et avant l'apex, un point sous-costal sous les deux derniers, un petit point terminal à l'extrémité de chaque nervure, enfin la frange concolore. Dessus des inférieures blanc testacé avec une ombre terminale plus large à l'apex et les petits points terminaux noirs comme aux supérieures. Frange blanche, grisant à l'apex. Dessous semblable, mais les deux gros points peu visibles aux premières ailes, les inférieures avec la côte sablée et plusieurs petits points dont deux cellulaires. Tête et dessus du corps noisette.

Loja, Équateur; un exemplaire.

Pionea viridalis n. sp. — 24 mill. — Dessus des supérieures verdâtre pâle, traversé par une extrabasilaire coudée, brune, la pointe du coude sur la médiane joignant une large tache cellulaire verte; une seconde tache verte, plus grande encore, un peu hexagonale, entoure la discocellulaire, et la cellule entre ces deux taches reste blanche; une seconde ligne transversale brune part du bord interne vers le troisième quart, fait un long coude intérieur sous la 2 qu'elle traverse à la hauteur de la seconde tache, retourne exté-

rieurement entre 2 et 3, se transforme alors en une ligne subterminale de points intranervuraux et finit par un demi-cercle subapical qui va couper la côte, suivi de trois points costaux également avant l'apex. Un tout petit point terminal noir à l'extrémité de chaque nervures; première moitié de la frange grise, moitié extérieure coupée de brun. Dessus des inférieures blanchâtre, avec une ombre terminale, un commencement de subterminale arrondie et un petit point discocellulaire; des petits points terminaux comme aux supérieures, la frange blanche et grise. Dessous des supérieures avec le centre enfumé, les taches cellulaires marquées en noirâtre, le centre cellulaire blanc, les points costaux, la bordure terminale pâle; dessous des inférieures blanchâtre, la côte sablée, les points cellulaires et la subterminale mieux indiquée qu'en dessus; les quatre ailes avec les petits points terminaux. Palpes verdâtres, le dessous blanc; tête et ptérygodes verdâtres; dessus du corps gris.

Loja, Équateur; un ♂.

TORTRICIDÆ.

Tortrix ruptimacula n. sp. — 33 mill. — Port de *Tortrix stapiana* Feld. et Rgh., pl. 139, fig. 47, mais le bord terminal des supérieures avec l'échancrure subapicale plus petite, la pointe inférieure entre 4 et 5. Ailes d'un carné clair teinté de jaunâtre par place, avec de nombreuses stries brunes entre les nervures, notamment dans la région terminale; supérieures avec les taches suivantes d'un vert sombre : deux points extrabasilaires au-dessus et en dessous de la médiane, une très large tache costale partant de la côte peu avant le milieu, à bord intérieur oblique et rigide, allant occuper toute la dernière partie de la cellule qu'elle ne dépasse pas en dessous mais qu'elle déborde assez régulièrement en dehors et au-dessus, à bord extérieur coudé entre 10 et 11, enfin une tache costale peu écartée, et faisant comme suite à la précédente; base et centre de l'aile semés de quelques atomes, la côte coupée, en plus des taches, de quelques petits points. Frange couleur du fond. Dessous comme le dessus, plus régulièrement teinté de jaunâtre et les taches vertes ne se voyant qu'en ombres. Tête, corps et pattes couleur du fond des ailes.

Vallée de la Zamora et Cayanuma près Loja, Équateur; deux ♀.

Atteria purpurea n. sp. — 33 mill. — Dessus des supérieures bleu sombre rougeâtre à reflets métalliques, semé de taches irrégulières jaune d'or liséré de brun ferrugineux; ces taches coupent la côte, les bords terminal et interne, avec une rangée centrale, simple au départ puis dédoublée. Dessous des inférieures

jaune d'or, les taches brun rougeâtre sombre; celles-ci coupent le bord terminal, la côte et traversent au premier et au second tiers, le bord abdominal complètement brun. Frange aux premières ailes bleu et or, aux secondes ailes brun et or. Palpes bleu noir avec un trait or en dessus; tête et collier bleu noir et or; ptérygodes bleu noir lisérées d'or; abdomen bleu noir annelé d'or; anus jaune d'or; pattes bleu noir et or.

Loja, Équateur; une ♀.

Atteria unciana n. sp. — 27 mill. — Dessus des supérieures d'un beau jaune orangé luisant, avec la côte et la frange paille régulièrement coupées de taches noir violacé à peu près deux fois plus longues que le liséré paille, une double rangée subterminale régulière de petits points, le reste de l'aile et le bord interne semés de points. Tous les points et taches des quatre ailes sont noir plus ou moins violacé suivant l'angle. Dessus des inférieures jaune orangé luisant un peu plus pâle qu'aux premières ailes, sans liséré costal, la côte coupée par un point avant l'apex, les bords terminal et abdominal régulièrement coupés de points, deux points intérieurs sous la cellule et la 2 et un subterminal entre 5 et 6. Taches terminales se continuant sur les franges qui sont paille. Dessous pareil laissant voir en plus quelques points basilaires et costaux aux secondes ailes. Palpes, tête, collier, thorax, corps et pattes noir à reflets violacés et paille.

Vallée de la Zamora, Équateur; une ♀.

Atteria fumipennis n. sp. — 32 mill. — Ailes d'un jaune cuivreux sombre, les supérieures avec une large bande costale paille coupée de taches noires à reflets verts ou bleutés, la frange paille coupée ainsi que le bord terminal par les taches noires qui s'y continuent, le reste de l'aile semé de points noir bleuté. Les inférieures avec de gros points centraux et terminaux d'un noir plus pâle, la région apicale et le bord abdominal entièrement enfumés de noirâtre; la frange noire avec quelques éclaircies blanches à l'apex, cuivreuses ailleurs. Dessous des premières ailes comme le dessus; dessous des inférieures jaune cuivreux sombre mais non enfumé, les points bien nets sur la côte, le long du bord terminal, avec une rangée entre 5 et 6, une demi-lunule apicale et quelques points centraux dans la cellule et en dessous. Corps noir, les anneaux finement lisérés de paille; pattes noires et paille.

Un ♂ pris à Micay, Colombie, en août 1896.

TINEIDÆ.

Cryptolechia sexmaculata n. sp. — 42 mill. — Dessus des supérieures d'un blanc un peu plombé luisant avec six taches arron-

dies noir bleuté : quatre costales (basilaire, extrabasilaire, médiane et subapicale) et deux centrales (l'une dans la partie supérieure de la cellule avant le milieu, la seconde, la plus grande des six, discocellulaire). Dessus des inférieures et franges gris ardoisé pâle luisant. Dessous des quatre ailes gris ardoisé luisant avec le rappel par transparence des taches cellulaires aux supérieures, la frange blanche aux premières ailes, gris ardoisé aux inférieures, sauf une partie de l'apex qui est blanche. Tête, thorax et ptérygodes blancs; corps et pattes gris mêlé de poils blancs.

San Francisco près Loja, Équateur; une ♀.

Coptotelia nigriplaga n. sp. — 19 et 20 mill. — Dessus des supérieures rouge mélangé de jaune, les régions costale, cellulaire et terminale brun violacé, avec plusieurs groupes de taches. Le premier groupe en comprend cinq presque en anneau dont deux cellulaires, une en dessus et deux en dessous, la seconde tache cellulaire blanc pur, les quatre autres paille. Le second groupe repose sur la discocellulaire et se compose d'une tache blanc pur bien ronde dans la cellule et de six plus petites taches paille extérieures, disposées en éventail entre les nervures; les trois taches inférieures entre 2 et 5 suivies d'une ombre noire. Un troisième groupe de quatre petites taches paille est sous-médian, entre les deux premiers; enfin, l'aile est encore marquée de trois taches subcostales, médiane au second tiers et subapicale, chacune surmontée à la côte et à l'apex d'une petite éclaircie pâle. Frange pâle, coupée de brun sous l'apex, au milieu et à l'angle. Cette description est faite sur le type provenant de la vallée de la Zamora, absolument pur et frais; dans les autres spécimens, une partie des taches disparaît dans le fond. Dessus des inférieures avec la première partie de la côte blanche, puis rosé et avec une large bordure terminale brune; la frange grise. Dessous des ailes plus pâle, la côte et le bord terminal cendrés de blanc, les taches reparaissant en partie et pâles aux supérieures. Palpes et tête jaune rosé; thorax et ptérygodes rouge brun; pattes cendrées de blanc.

Vallée de la Zamora, Équateur (mai 1886); Popayan, Colombie; La Urruca près San José, Costa-Rica; plusieurs ♂.